

---

**Bempedoinsäure**

---

**Lipidsenker**

- A.** Regelmäßige Einnahme
- D.** 1 x tgl. 180 mg, bei Komb. Simvastatin-Dosis auf 20 mg (bis 40 mg) tgl. begrenzen
- H.** Bei Komb. mit Statinen Myopathie gelegentlich mgl., daher sind alle ungeklärten Muskelbeschw., jede Muskelempfindlichkeit u. -schwäche unverzüglich zu melden. Frauen im gebärfähigen Alter müssen eine zuverlässige Verhütungsmethode anwenden. Bei Schwangerschaftswunsch ist das AM abzusetzen.
- KI.** Komb. mit Simvastatin > 40 mg/d. Keine Erfahr. bei Kdr. u. Jgl. < 18 J., bei schweren L/N-Funktionsstör. zusätzliche Überwachung erforderlich.
- NW.** (h): Schmerzen in d. Extremitäten, Gicht, Hyperurikämie, Anämie, Leberenzyme erhöht.  
Dieses AM unterliegt einer zusätzlichen Überwachung. bitte jede NW. melden.
- WW.** Statine†, Bosentan u. Fimasartan u. Asunaprevir u. Glecaprevir u. Grazoprevir u. Voxilaprevir (Plasmakonz.†)