

## Bicalutamid



### Prostatatherapeutikum

- A.** Regelmäßige Einnahme
- D.** 1 x tgl. 50–150 mg; als Monotherapie o. adjuvant zur Prostatektomie o. Strahlentherapie 1x tgl. 150 mg mind. 2 J.o. bis zum Auftreten einer Progression
- H.** Leberfunktionskontrolle notwendig, bei Herzerkr. Herzfunktion kontrollieren
- KI.** Kdr. u. Jgl. sowie Frauen, Komb. mit Terfenadin, Astemizol u. Cispriid; Vorsicht bei Komb. mit Ciclosporin u. Calciumkanalblockern, Cimetidin u. Ketoconazol. Vorsicht bei QT-Verlängerung, mittelschweren bis schweren Leberfunktionsstör., schwerer Nierenfunktionsstör., Komb. mit AM, die durch CYP-3A4 Enzyme metabolisiert werden
- NW.** Hautausschlag (sh), Gynäkomastie (sh); (sh-h): M/D-Beschw., Schwindel, Hitzewallungen, Hämaturie, Anämie. Sexuelle Stör. (h), Schläfrigkeit (h), Depression (h), Ödeme (h), Gewichtszunahme, Lebererkr.
- WW.** AM, die das QT-Intervall verlängerns.<sup>1</sup> o. Torsades de pointes hervorrufen können (Antiarrhythmika Kl. 1A, Kl. III, Methadon, Moxifloxacin, Neuroleptika), blutgerinnungshemmende AM vom Cumarin-Typ (Prothrombinzeit überwachen), weitere WW. ► unter KI.

<sup>1</sup> QT  
Fortsetzung s. nächste Seite