

---

**Bilastin**

---

**Antihistaminikum**

- A.** 1 h vor oder 2 h nach Aufnahme von Nahrung o. Fruchtsaft einnehmen
- D.** **Erw. u. Jgl. ab 12 J. bei allergischer Rhinokonjunktivitis u. Urtikaria:** 1 x tgl. 20mg  
**Kdr. von 6-11 J. u. einem KG von mind. 20 kg:** 1 x tgl. 10mg SMT
- H.** Nahrungsmittel u. Grapefruit-Saft (könnte auch für andere Fruchtsäfte zutreffen) reduzieren die Bioverfügbarkeit um 30 %. Wechselwirkungsstudien bisher nur bei Erw. durchgeführt.
- KI.** Kdr. < 6 J. und < 20 kgKG. Die Sicherheit bei Kdr. mit L/N-Funktionsstör. ist bisher nicht erwiesen. Komb. mit P-Glykoprotein-Inhib. wie Ketoconazol, Erythromycin, Ciclosporin, Ritonavir, Diltiazem bei Pat. mit einer moderaten o. schweren Niereninsuff. vermeiden.
- NW.** Somnolenz u. Kopfschmerzen (h)
- WW.** Ritonavir u. Diltiazem u. Ketoconazol u. Erythromycin u. Ciclosporin (B.-Plasmakonz.↑ u. -NW.↑)