

## Enzalutamid



### Antiandrogen

- A.** Unzerkaut u. unzerbrochen mit Wasser einnehmen.
- D.** 160 mg als tgl. Einzelgabe, bei Komb. mit einem starken CYP2C8-Inhib. wie Gemfibrozil 80 mg/d
- H.** Bei intolerablen NW. Therapie für 1 Wo. unterbrechen. Ein Kondom ist während d. Th. u. für 3 Mon. danach erforderlich, wenn der Pat. mit einer schwangeren Frau sexuell aktiv ist. Bei Verkehr in dieser Zeit mit einer Frau im gebärfähigen Alter sind sowohl ein Kondom als auch eine andere zuverlässige Verhütung erforderlich. Auf Hautreakt. achten! Kein relevanter Nutzen bei Kdr. u. Jgl.  
Gastrointestinale Blutung, Hämaturie u. Dysurie bzw. Harndrang sofort dem Arzt mitteilen.
- KI.** Vorsicht bei schweren L/N-Funktionsstör., Krampfanfällen in d. Anamnese. Frauen, die schwanger sind o. werden könnten. Komb. mit Cumarin-Antikoagulanzen meiden. Komb. mit Gemfibrozil o. a. CYP2C8-Inhib. vermeiden o. mit Vorsicht anwenden. Vorsicht u. a. bei Pat. mit kürzlichen kardiovaskulären Erkr. (keine Erfahr.),
- NW.** (sh): Hitzewallungen, Hypertonie, Stürze u. Frakturen, Asthenie u. Fatigue  
(h): Angst, Kopfschmerzen, Amnesie, Aufmerksamkeitsstör., Dysgeusie, Restless-Legs-Syndrom, Gynäkomastie, Juckreiz., ischämische Herzerkr.  
Krampfanfälle (g)

## 2 Enzalutamid

**WW.** Paracetamol (Lebertox.↑). WW. sind mgl. (evtl. erst nach 1 Mon.) mit best. Analgetika, Antibiotika, Antiepileptika, Antipsychotika, Anti-thrombotika, Betablockern, Cumarin-Antikoagulanzen, Kalzium-antagonisten, Kortikosteroiden, HIV-AM, Hypnotika, **Omeprazol**, Immunsuppressiva, PPI, Statine, Levothyroxin u. w. AM ► Fachinfo! Colchicin u. Dabigatranetexilat u. Digoxin (Dosisanpassung evtl. erforderlich), AM, die das QT-Intervall verlängern können s.QT, Midazolam↓

**MP.** unzerkaut u. unzerteilt