
Fezolinetant



Gynekokologikum

- A.** Unzerkaut, im Ganzen einnehmen, etwa zur gleichen Tageszeit
- D.** 1 x tgl. 45 mg
- KI.** Komb. mit moderaten o. starken CYP1A2-Inhib., keine Erfahr. bei Pat. > 65 J., bei mittelschweren bis schweren Leberfunktionsstör. nicht empfohlen, bei schweren Nierenfunktionsstör. nicht empfohlen. Nicht empfohlen bei gleichzeitiger Th. von Brustkrebskrkr. o. a. estrogenabhängigen Malignomen u. Komb. mit estrogenbasierter Hormonersatzth. - ausgenommen lokale vaginale Präp. - (keine Erfahr.). Vorsicht bei Krampfanfällen o. konvulsiven Erkr. in d. Anamnese (keine Erfahr.)
- NW.** (h): *Schlaflosigkeit, M/D-Beschw.*, erhöhte Leberwerte
▼ Dieses AM unterliegt einer besonderen Beobachtung. Bitte jede NW. melden!
- WW.** Moderate bis schwere CYP1A2-Inhib. wie ethinylestradiolhaltige Kontrazeptive u. Mexiletin u. Enoxacin u. Fluvoxamin (F-Plasmaspiegel↑)