

---

## Ivermectin

---



### Anthelminthikum, Antiscabiosum

- D. Gastrointestinale Strongyloidiasis:** Einmalig 200 µg/kg KG, weitere Angaben ► Fachinfo  
**Scabies:** Einmalig 200 µg/kg KG
- H. Skabies:** Von einer definitiven Abheilung kann erst nach 4 Wo. ausgegangen werden. Auch anhaltender Pruritus o. Kratzläsionen rechtfertigen keine zweite Th. in diesen 4 Wo.  
Eine Beeinträchtigung d. Reaktionsvermögens kann nicht ausgeschlossen werden. Kontaktpers. sollten sich einer ärztl. Untersuchung unterziehen u. ggf. sofort behandelt werden. Fingernägel kurz u. sauber halten, offizielle Empfehlungen zur Reinigung von Kleidung u. Bettwäsche sind genau zu befolgen
- KI.** Strenge Indikationsstellung in Schwangerschaft u. Stillzeit. Sicherheit bei Kdr. u. Jgl. < 15 kg KG nicht erwiesen. Vorsicht bei älteren Pat.
- NW.** Leberfunktions- u. Blutbildungsstör. sowie Hämaturie mgl.  
**Skabies:** Vorrübergehende Exazerbation des Pruritus zu Behandlungsbeginn  
Bei Anwendung als Anthelminthikum ► Fachinfo
- MP.** 2h vor oder nach der Mahlzeit