

Loperamid



Antidiarrhoikum

- A.** TAB: Unzerkaut. SMT wird auf die Zunge gelegt.
- D. Akuter Durchfall** : Selbstmedikation (HKP/TAB/SMT): Erw. initial 4 mg, dann nach jedem ungeformten (weichen) Stuhl 2 mg; max. 12 mg/d. Bei ärztl. Verordnung (HKP/TAB/TRO): max. 16 mg/d. Bei akuten Durchfällen nur 2 d anwenden.
Jgl. ab 12 J.: Selbstmedikation (HKP/TAB/SMT): Initial 2 mg, dann nach jedem ungeformten (weichen) Stuhl 2 mg, max. 8 mg/d. Bei akuten Durchfällen nur 2 d anwenden.
Kdr. 8 J.: Nur mit ärztl. Verordnung (HKP/TAB/TRO): Initial 2 mg, dann nach jedem ungeformten (weichen) Stuhl 2 mg, max. 8 mg/d. Auch Angaben für Kdr. 6 J. ► Fachinfo.
Ch ron. Durchfall: Nur mit ärztl. Verordnung (HKP/TAB/TRO): Erw. 4 mg/d; Kdr. 8 J. 2 mg/d. Max. 4 Wo. ohne ärztl. Aufsicht
Alle Dosierungen sind berechnet als Loperamid-HCl.
Kdr. 2-8 J. nur mit ärztl. Verordnung (TRO) Dos. ► Fachinfo
- H.** Absetzen, wenn bei akutem Durchfall nach 48h keine Besserung eintritt. Wegen Flk./-Salzverlust gesüßten Tee, Saft, Salzgebäck, klare Brühe zu sich nehmen; absetzen bei Obstipation, aufgetriebenem Leib o. Ileus
Cave Missbrauch, Brugada-Syndrom mgl. Schwerwiegende kardiale Stör. in höherer Dosierung z. B. bei Missbrauch u. Fehlgebrauch
- KI.** Kdr. 2 J., Kdr. 8 J. (HKP/TAB//SMT), Selbstmedikation: Kdr. 12 J. (HKP/TAB/SMT/TRO); Durchfall mit Fieber u./o. blutigem Stuhl, Durchfall während/nach Antibiotika-Einnahme, bakterielle Enterocolitis, akuter Schub einer Colitis ulcerosa, wenn eine Hemmung d. Peristaltik vermieden werden muss bei Risiko von Folgeerscheinungen (einschl. Ileus, Megacolon); Vorsicht bei Leberfunktionsstör. (KI. bei Selbstmediaktion). Bei ärztlicher Verordnung Anwendung im II. u. III Trimenon d. Schwangerschaft und in d. Stillzeit mgl.
- NW.** Kopfschmerzen u. M/D-Beschw. (h)

2 Loperamid

WW. Chinidin u. Ritonavir u. Itraconazol u. Ketoconazol u. Gemfibrozil (L.-Plasmaspiegel↑); AM, die die M/D-Tätigkeit dämpfen – z. B. morphinhaltige AM (L.↑), Desmopressin (Plasmakonz.↑)

MP. TAB: unzerkaut. Schmelztablette auf die Zunge legen. Selbstmedikation: höchstens 2 d