

---

**Nabilon**

---

**Antiemetikum**

- D.** 1. Dosis zu 1 mg am Abend vor Beginn d. Chemotherapie, 2. Dosis 1–3 h vor d. Chemotherapie; max. 6 mg/d in 3 ED
- H.** Nur einige Tage anwenden, cave Abhängigkeit, Toleranzentwicklung
- KI.** Überempfindlichkeit gegen Cannabinoide. Bei Kdr. u. Jgl. < 18 J. und bei schwerer Leberfunktionsstör. nicht empfohlen. In d. Schwangerschaft nur bei zwingender Indikation. Vorsicht u. a. bei Pat. mit Suchtmittel- o. AM-Missbrauch, Alkoholmissbrauch o. -abhängigkeit, bei Hypertonie o. Herzerkr.
- NW.** (h): Somnolenz, Schlafstör. Schwindel, Kopfschmerzen, Ataxie, Euphorie/Dysphorie, Sehstör., Hypotonie, Mundtrockenheit, Nausea
- WW.** Alkohol, Antihistaminika, zentraldämpfende AM $\uparrow$ , Sympathikomimetika, Amphetamine, Amoxapin, Desipramin u. a. tricyclische Antidepressiva, Lithium, Anticholinergika, Buspiron, Disulfiram, Fluoxetin, Antipyrine, Theophyllin, Naltrexon