

Palbociclib



- D.** 1 × tgl. 125 mg für 21 d gefolgt von 7 d Pause
- H.** Grapefruitsaft meiden. Bei Frauen ist eine höchstzuverlässige Verhütungsmethode erforderlich. Fieberepisoden unverzüglich Arzt melden. Vor Th.-Beginn, zu jedem Zyklus sowie am 14. Tag der ersten beiden Zyklen große Blutbildkontrolle
- KI.** Keine Erfahr. bei Kdr. u. Jgl. < 18 J. , **Komb. mit Johanniskrautpräp.**; Vorsicht bei L/N-Funktionsstör., Komb. mit starken CYP-3A4-Inhib.² vermeiden
- NW.** Infektionen (sh), Blutbildveränderungen (sh), Fatigue (sh), verminderter Appetit u. M/D-Beschw. (sh), Geschmacksstör. (h), Sehstör. (h), Epistaxis (h), Hauserkr./Alopezie (h), erhöhte Leberenzyme (h)
Dieses AM unterliegt einer zusätzlichen Überwachung - bitte jede NW. melden!
- WW.** Starke CYP-3A4-Inhib.⁵ (P.↑), starke CYP-3A4-Induk.⁶ (P.↓), PPI, Midazolam↑, Alfentanil u. Ciclosporin u. Ergotamin/Dihydroergotamin u. Fentanyl u. Pimozid u. Chinidin u. Sirolimus/Tacrolimus/ Everolimus (ggf. Dosisanpassung erforderlich); Digoxin u. Dabigatran u. Colchicin u. Pravastatin u. Rosuvastatin u. Sulfalsalzin (W. u. NW.↑), Metformin↑
- MP.** Mit der Mahlzeit, Grapefruitsaft meiden

² IH

⁵ IH

⁶ IK

Fortsetzung s. nächste Seite