

Palbociclib



Protein-Kinase Inhibitor

- A.** Dosis jeden Tag ungefähr zur gleichen Tageszeit unzerkaut einnehmen. Zerbrochene, gerissene o. anderweitig beschädigte FTA dürfen nicht eingenommen werden.
- D.** 1 × tgl. 125 mg für 21 d gefolgt von 7 d Pause. Therapie in Kombination mit weiteren AM ► Fachinfo.
- H.** Grapefruitsaft meiden. Bei Frauen ist eine höchstzuverlässige Verhütungsmethode erforderlich. Fieberepisoden unverzüglich Arzt melden. Vor Th.-Beginn, zu jedem Zyklus sowie am 14. Tag der ersten beiden Zyklen große Blutbildkontrolle. Falls Pat. sich erbricht o. Dosis auslöst, erst am folgenden Tag nächste Dosis einnehmen.
- KI.** Keine Erfahr. bei Kdr. u. Jgl. < 18 J., **Komb. mit Johanniskrautpräp.**; Vorsicht bei L/N-Funktionsstör., Komb. mit starken CYP-3A4-Inhib.¹ u. starken CYP-3A4-Induk.² vermeiden
- NW.** Infektionen (sh), Blutbildveränderungen (sh), Fatigue (sh), Pyrexie (sh), verminderter Appetit u. M/D-Beschw. (sh), Geschmacksstör. (h), Sehstör. (h), Epistaxis (h), Hauterkr./Alopezie (sh), erhöhte Leberenzyme (sh)
- WW.** Starke CYP-3A4-Inhib.³ (P.†), starke CYP-3A4-Induk.⁴ (P.↓), Midazolam↑, Alfentanil u. Ciclosporin u. Ergotamin/Dihydroergotamin u. Fentanyl u. Pimozid u. Chinidin u. Sirolimus/Tacrolimus/Everolimus (Exposition verstärkt, ggf. Dosisanpassung erforderlich); Digoxin u. Dabigatran u. Colchicin u. Pravastatin u. Rosuvastatin u. Sulfasalzin (W. u. NW.†), Metformin†
- MP.** Mit der Mahlzeit, Grapefruitsaft meiden. FTA im Ganzen schlucken!

¹ IH

² IK

³ IH

⁴ IK