
Prasugrel

**Thrombozytenaggregationshemmer**

- A.** TAB nicht zerkleinern, TAB zu 15 mg können geteilt werden. Nicht ohne ärztl. Rat absetzen
- D.** Initial 1 x tgl. 60 mg; Erhaltungsdosis 1 x tgl. 10 mg, Pat. < 60 kg KG 1 x tgl. 5 mg.
(Nur in Komb. mit ASS (75-325 mg/d).
- H.** Th.-Dauer bis zu 12 Mon. Besondere Vorsicht bei älteren Pat. (75 J. und älter). Bei jeder ungewöhnlichen Blutung Arzt aufsuchen. Vor jeder geplanten OP Arzt/Zahnarzt informieren. Wenn keine anti-thrombotische W. gewünscht wird, spätestens 7 d vor der OP absetzen, Details ► Fachinfo.
- KI.** Keine Erfahr. bei Kdr. u. Jgl. < 18 J., Schlaganfall o. transitorische ischämische Attacke in d. Anamnese, schwere Leberfunktionsstör.; Vorsicht u. a. bei Blutungsneigung (z. B. durch Trauma, OP, gastro-intestinale Blutung o. akutes Magengeschwür) u. bei Komb. mit Cumarinderivaten, NSAR einschließl. COX-2 Hemmern, oralen Antikoagulanzen, Clopidogrel, Fibrinolytika. Strenge Indikationsstellung in d. Schwangerschaft
- NW.** Blutungen (h), Anämie (h), Hautreakt. (h)
- WW.** NSAR einschließl. COX-2 Hemmer u. Cumarinderiv. u. Clopidogrel u. Fibrinolytika u. Heparin (Blutungsneigung↑), Morphin u. Opioide (P.), Cyclophosphamid u. Efaviranz (verringertes Abbau)
- MP.** TAB nicht zerkleinern (TAB zu 15 mg können geteilt werden)