

Ranolazin



Herzmittel

- D.** Initial 2 × tgl. 375 mg, Steigerung nach 2–4 Wo. auf 2 × tgl. 500 mg; TMD: 2 × tgl. 750 mg
- H.** Es gibt eine Patienteninformationskarte des Herstellers
- KI.** Schwere Nierenfunktionsstör., mäßige bis schwere Leberfunktionsstör., Komb. mit starken CYP-3A4-Inhib.⁵, Komb. mit Antiarrhythmika Kl. Ia (Chinidin) o. Kl. III (Dofetilid, Sotalol) außer Amiodaron; Vorsicht u. a. bei leichten bis mäßigen Nierenfunktionsstör., leichten Leberfunktionsstör., geringen KG (unter 60 kg), älteren Pat., mäßiger bis schwerer chronischer Herzinsuffizienz, bei Komb. mit mittelstarken CYP-3A4-Inhib.s.IH.^{6,7} Komb. mit CYP-3A4-Induk.⁸ vermeiden. Vorsicht bei Komb. mit Bupropion u. Efavirenz u. Cyclophosphamid. In d. Schwangerschaft nur bei zwingender Indikation. Keine Erfahr. bei Kdr. u. Jgl. < 18 J.

NW. Schwindel u. Kopfschmerzen (h), M/D-Beschw. (h)

- WW.** CYP-3A4-Inhib.¹ u. Ciclosporin[†] u. CYP-2D6-Inhib. wie Paroxetin (R.-Plasmakonz.↑), CYP-3A4-Induk.⁴ (R.-Plasmakonz.↓), Atorvastatin u. Simvastatin u. Lovastatin u. Tacrolimus u. Sirolimus u. Everolimus u. Metoprolol u. Propafenon u. Flecainid u. tricyclische Antidepressiva u. Antipsychotika u. Digoxin u. Metformin u. Pindolol u. Vareniclin (Plasmakonz.↑), QT-Intervall verlängernde AM¹⁰ (Arrhythmien mgl.). Weitere WW. ► unter KI.

⁵ s.IH

⁶

⁷ .

⁸ s.IK

¹⁰ s.QT

Fortsetzung s. nächste Seite