

Rupatadin



Antihistaminikum

- D.** **Erw. u. Jgl. > 12 J.:** 1 × tgl. 10 mg
Kdr. 2–11 J. und KG > 25 kg: 1 × tgl. 5 mg
Kdr. mit einem KG von 10–25 kg: 1 × tgl. 2,5 mg
- H.** Nicht mit Grapefruitsaft einnehmen
- KI.** In Schwangerschaft u. Stillzeit nicht empfohlen, keine Erfahr. b. Kdr. < 2 J., Komb. mit starken CYP-3A4-Inhib.³ vermeiden. Vorsicht bei Komb. mit mäßig starken CYP-3A4-Inhib.⁴ sowie bei QT-Verlängerung, Hypokaliämie o. proarrhythmischen Erkr. u. Komb. mit AM mit enger therapeutischer Breite sowie mit Statinen. Vorsicht b. älteren Pat., bei L/N-Funktionsstör. nicht empfohlen (keine Erfahr.)
- NW.** Kopfschmerzen u. Schläfrigkeit u. Schwindel (h), Mundtrockenheit (h)
- WW.** Alkohol↑ (bei Dos. von 20 mg), zentraldämpfende AM (WW. nicht auszuschließen), Simvastatin u. Lovastatin u. Ciclosporin u. Tacrolimus u. Sirolimus u. Everolimus u. Cisaprid (Plasmakonz. kann erhöht sein)

³ s.IH

⁴ s.IH

Fortsetzung s. nächste Seite