
Secukinumab

**Immunsuppressivum**

- A.** S. c., von Psoriasis betroffenen Hautstellen meiden
- D.** **Plaque-Psoriasis und Psoriasis-Arthritis:** 300 mg s.c. mit Startdosen in d. Wo. 0,1,2,3 und 4 gefolgt von monatlichen Erhaltungsdosen
Ankylosierende Spondylitis: 150 mg s.c. mit Startdosen in d. Wo. 0,1,2,3 und 4 gefolgt von monatlichen Erhaltungsdosen
- H.** Klinisches Ansprechen allgem. nach 16 Wo., bei Frauen im gebärfähigen Alter während d. Therapie und 20 Wo. danach zuverlässige Verhütungsmethode anwenden. Komb. mit anderen Immunsuppressiva einschließlich Biologica o. einer Phototherapie wurde bei Psoriasis nicht untersucht
- KI.** Klinisch relevante, aktive Infektion, Komb. mit Lebendimpfstoffen, keine Erfahr bei Kdr. u. Jgl. <18 J.; Vorsicht u. a. bei M. Crohn
- NW.** Infektionen (sh), Rhinorrhoe (h), Diarrhoe (h)
- WW.** Lebendimpfstoffe (nicht gleichzeitig anwenden)
- MP.** Subctan, von Psoriasis betroffene Hautstellen meiden