

## Tacrolimus



### Immunsuppressivum

- A.** Kps. nach Entnahme aus d. Blisterpackung sofort mit etwas Flk. (am besten Wasser) einnehmen.
- D.** s. Fachinfo; TD in zwei ED (z. B. morgens u. abends)
- H.** Grapefruitsaft meiden. Risiko für opportunistische Infektionen erhöht. Regelmäßige Überwachung d. Blut-Talspiegel u. anderer Parameter. Pat. mit schwarzer Hautfarbe benötigen höhere Dos. Umstellung d. Arzneistoff-Formulierung nur unter engmaschiger Kontrolle eines erfahrenen Spezialisten.
- KI.** Überempfindlichkeit gegen andere Makrolide, Komb. mit Lebendimpfstoffen, Kalium u. kaliumsparenden Diuretika, pflanzlichen Heilmitteln u. Ciclosporin. Vorsicht u. a. bei Herzerkr., Komb. mit Kortikosteroiden; strenge Indikationsstellung in d. Schwangerschaft
- NW.** Infektionen, Hyperglykämie u. Hyperkaliämie (sh), Schlaflosigkeit u. Kopfschmerzen u. Tremor (sh), M/D-Beschw. (sh), Hypertonie (sh) u. a. Gefäßerkr. (h), psychiatr. Stör. (h), Nierenfunktionsstör. (sh), Sehstör. u. Tinnitus (h), Atemwegsstör. (h), Hautreizungen (h), Schmerzen d. Bewegungsapparats (h), Blutbildungsstör. (h), Elektrolytstör. (h), Lebererkr. (h)
- WW.** Alkohol, CYP-3A4-Inhib.<sup>1</sup>(T.↑), CYP-3A4-Induk., auch Johanniskrautpräp.<sup>2</sup>(T.↓), hochdosiertes Prednisolon u. Methylprednisolon (T.↑ o. ↓), Erhaltungsdosen von Kortikosteroiden u. Metamizol u. Isoniazid (T.↓), Ibuprofen u. Amphotericin B u. weitere nephrotox. AM wie Aminoglykoside, Gyrasehemmer, Cotrimoxazol, NSAR, Aciclovir, Vancomycin (Nephrotox.↑), Danazol u. Ethinylestradiol u. Omeprazol u. orale Antikoagulantien u. orale Antidiabetika (WW. mgl.), Impfungen↓, hormonelle Kontrazeptiva (Hormonexposition↑), weitere WW. ► unter KI. u. s. Fachinfo

<sup>1</sup> s.IH

<sup>2</sup> s.IK

Fortsetzung s. nächste Seite