

Tirbanibulin



Antiandrogen, Dermatikum

- A.** Die Salbe sollte in einer dünnen Schicht auf ein Areal von bis zu 25 cm² appliziert werden, auf einer nach einer AM-Therapie oder einem Eingriff abgeheilten Haut. Vor d. Anwendung Areal mit Wasser o. milder Seife reinigen u. abtrocknen. Nicht auf offenen Wunden o. verletzter Haut auftragen.
- D.** In einem Behandlungszyklus von 5 aufeinanderfolgenden Tagen 1 x tgl. Salbe (10mg/g) ungefähr zur gleichen Uhrzeit im Gesicht oder auf der Kopfhaut auftragen. Nach d. Anwendung d. Areal innerhalb von 8 h nicht waschen o. berühren.
- H.** Die Wirkung kann nach rund 8 Wo. beurteilt werden. Es gibt keine Erfahr. für mehr als einen Behandlungszyklus. **Kontakt mit Augen, Lippen und dem Innern von Nasen und Ohren sollte vermieden werden.** Vor u. nach d. Auftragen Hände mit Wasser und Seife waschen.
- KI.** Vorsicht bei immunsupprimierten Pat., die Anwendung bei Frauen im gebärfähigen Alter, die nicht verhüten, wird nicht empfohlen.
- NW.** (sh): Erythem u. Schuppenbildung u. Schorf u. Schwellung u. Erosion an der Applikationsstelle
(h): Schmerzen u. Pruritus u. Bläschen an der Applikationsstelle
Dieses AM unterliegt einer zusätzlichen Überwachung. bitte jede NW. melden!