

## Voriconazol



### Antimykotikum

- A.** **Mind. 1 h vor oder 1 h nach dem Essen**
- D.** **Erw. u. Jgl. ab 15 J. u. ab 40 kg KG oral:** in den ersten 24 h 400 mg alle 12 h, danach 2 × tgl. 200 (–300) mg  
**Erw. u. Jgl. ab 15 J. u. unter 40 kg KG oral:** in den ersten 24 h 200 mg alle 12 h, danach 2 × tgl. 100 mg
- H.** **Frauen im gebärfähigen Alter müssen eine zuverlässige Kontrazeption anwenden.** Regelmäßige Kontrolle der L/N-Werte. Wegen der ausgeprägten NW. ist eine sorgfältige Betreuung des Pat. erforderlich! Th.-Dauer so kurz wie mgl.
- KI.** Überempfindlichkeit gegen Azole; Komb. mit Terfenadin, Astemizol, Cisaprid, Pimozid, Chinidin, Rifampicin, Efavirenz, Carbamazepin, Phenobarbital, Ergot-Alkaloiden, Sirolimus, Ritonavir, Johanniskrautpräp.; Vorsicht u. a. bei Lebererkr., Komb. mit AM, die d. QT-Intervall verlängern<sup>1</sup>, Arrhythmien, Kardiomyopathie, kardiotox. Chemotherapie, Hypokaliämie, Komb. mit CYP-3A4-Induk.<sup>2</sup>, Everolimus, Methadon, Opiaten, Fluconazol. Keine ausreichenden Erfahr. bei Kdr. < 2 J.
- NW.** (sh): **Sehstör., Hauterkr., periphere Ödeme, Kopfschmerzen, Atemnot, M/D-Beschw., Fieber, anormale Leberwerte; weitere häufige NW.** ► Fachinfo!
- WW.** Siehe unter KI.! Dosisreduktion u. a. bei **NSAR, Omeprazol**, Benzodiazepinen, Statinen, Sulfonylharnstoffen, Vinca-Alkaloiden. Viele weitere WW., auch **orale Kontrazeptiva** u. Antikoagulanzein vom Cumarin-Typ, ► Fachinfo!
- MP.** mind. 1 Stunde vor oder 1 Stunde nach der Mahlzeit

<sup>1</sup> s. QT

<sup>2</sup> s. IK

Fortsetzung s. nächste Seite