

Cefpodoxim



Antibiotikum, Cefalosporin

- A.** Regelmäßige Einnahme alle 12 Stunden. Die Suspension ist begrenzt verwendbar, kühl aufzubewahren u. vor Gebrauch zu schütteln.
- D.** **Erw. u. Kdr. > 12 J.:** 2 x tgl. 100-200 mg, TMD 400 mg
Kdr. 4 Wo. bis 12 J. (< 25 kgKG): 5-12 mg/kg KG/Tag in 2 ED
Th.-Dauer 5-10 d, außer bei akuter Gonorrhoe (Einmalgabe)
- H.** Falsch positive Ergebnisse des Coombs-Tests u. nicht enzymatischer Harnglucosebestimmung.
- KI.** Überempfindlichkeit gegen Cefalosporine u. a. Betalactam-Antibiotika, M/D-Stör.; Vorsicht bei ausgeprägten Allergien (Heuschnupfen o. Asthma) in d. Anamnese. Strenge Indikationsstellung in d. Schwangerschaft, bes. im I. Trimenon. Keine Erfahrungen u. nicht empfohlen bei Sgl. < 4 Wo. bzw. bei Sgl. von 4 Wo. bis 3 Mon. mit Nierenfunktionsstör.
- NW.** Allerg. Reakt. (h), M/D-Beschw. (h), bei lang anhaltenden , schweren Durchfällen umgehend Arzt aufsuchen.
SUS. (zusätzlich): Superinfektion mit Pilzen (h)
- WW.** Antazida u. H₂-Rezeptorenblocker (C.↓ - 2-3h Abstand einhalten), bakteriostatisch wirkende Antibiotika wie Tetracycline, Erythromycin (C.↓)
- MP.** FTA: Mit der Mahlzeit u. einem Glas Wasser; SUS.: Mit der Mahlzeit