

## Dapagliflozin



### Antidiabetikum

- A.** Tbl. als Ganzes einnehmen
- D.** 1 x tgl. 10 mg
- H.** Die Wirkung ist von d. Nierenfunktion abhängig, sie ist bei moderater Nierenfunktionsstör. bereits reduziert. Bei Pyelonephritis o. Urosepsis Th.-Pause in Betracht ziehen. Sorgfältige Überwachung d. Volumenstatus u. d. Elektrolyte empfohlen. **Test auf Harnzucker fällt aufgrund d. Wirkungsmechanismus positiv aus.**
- KI.** D. sollte nicht bei Typ-1-Diabetes, zur Th. einer diabetischen Ketoazidose, bei Volumenmangel o. in Komb. mit Schleifendiuretika o. Pioglitazon angewendet werden. Vorsicht bei kardiovaskulären Erkr.; keine Erfahr bei Komb. mit Glucagon-like-Peptide-1-Analoga u. bei Kdr. u. Jgl. < 18 J.
- NW.** Hypoglykämie (sh bei Komb. mit Sulfonylharnstoffen u. Insulin), Infektionen d. Genitalbereiches (h), Harnwegsinfektionen (h), Schwindel (h), Rückenschmerzen (h), Dyslipidämie (h), Dysurie u. Polyurie (h)
- WW.** Thiazid- u. Schleifendiuretika (Dehydratisierung o. Hypotonie mgl.), Insulin u. Sulfonylharnstoffe (Hypoglykämie), Pioglitazon (geringfügig erhöhtes Risiko für Blasenkrebs)