

Darifenacin



Urologisches Spasmolytikum, selektiver Muskarin-M3-Rezeptor-Antagonist

D. RTA: 1 × tgl. 7,5 mg, nach 2 Wo. kann die Dos. auf 1 × tgl. 15 mg erhöht werden

H. Grapefruitsaft kann die W. verstärken

KI. Kdr. u. Jgl. <18 J.; Harnverhaltung, Retention des Mageninhalts, unbehandeltes und nicht beherrschbares Engwinkelglaukom, Myasthenia gravis, schwere Leberfunktionsstör., schwere Colitis ulcerosa, tox. Megacolon, Komb. mit starken CYP-3A4-Inhib.¹; Vorsicht bei Obstruktion der Harnwege o. des M/D-Kanals und bei Komb. mit AM, die eine Ösophagitis hervorrufen können (z. B. Bisphosphonate)

NW. Obstipation u. Mundtrockenheit (sh), Kopfschmerzen (h), M/D-Beschw. (h), trockene Augen (h)

WW. Paroxetin u. Terbinafin u. Cimetidin u. Chinidin (Da.↑), CYP-3A4-Inhib.¹ (Da.↑!), CYP-3A4-Induk.¹ (Da.↓), Ciclosporin u. Verapamil; Flecainid u. Thioridazin u. tricycl. Antidepressiva wie Imipramin (Dos. anpassen); Digoxin↑, Oxybutynin u. Tolterodin u. Flavoxat (verstärkte W. u. NW.), Anti-Parkinsonmittel↑

¹ ▶ S. 7 u. 8

Diese Angaben sind nicht vollständig – beachten Sie bitte die Erläuterungen und Hinweise ▶ Kap. 2