

## Methyldopa



### Antihypertonikum

A. Tbl. unzerkaut

D. Ein- u. ausschleichend

**Hypertonie bei Schwangerschaft:** 250-2000 mg in mehreren ED  
**Hypertonie in anderen Fällen** (vorzugsweise in Komb. mit anderen blutdrucksenkenden AM, insbes. Diuretika): initial 250 mg/d, Steigerung innerhalb weniger Tage, durchschnittliche Tagesdosis 500-750 mg

**KI.** Akute u. chron. Lebererkr., schwere Nierenfunktionsstör., Phaeochromozytom, Depressionen in d. Anamnese, schwere Herzinsuffizienz, haemolytische Anaemien. Strenge Indikationsstellung in d. Schwangerschaft, bes. im I. Trimenon

**NW.** Kopfschmerzen (sh), Sedierung (h), Fieber (bei 1-3 % der Pat. in d. ersten Th.-Wochen), Depression u. Halluzination (h), Bradykardie (h), M/D-Beschw. (h)

**WW.** Alkohol u. zentraldaempfindende AM (zentraldaempfindende W.↑), Lithium (Tox.↑), Eisen (M.↓), tricycl. Antidepressiva u. Barbiturate u. Sympathomimetika u. NSAR (M.↓), β-Rezeptorenblocker (schwere Bluthochdruckreakt.), L-Dopa (NW.↑, M.↑), Antihypertonika u. Diuretika u. Vasodilatoren (M.↑), Tolbutamid↑, Antikoagulanzen↑, Ephedrin (M.↓), MAO-Hemmer (NW.)