

## Molnupiravir



- A.** Alle nachfolgenden Angaben des Profils sind vorläufig! Stand der Info: 15.1.2022  
Beratung gemäß Checkliste der AMK dokumentieren. Schriftliche Info des BfArM mit abgeben!  
Anwendung sobald wie mgl. nach Diagnostizierung und innerhalb von 5 Tagen nach Symptombeginn. **Regelmäßige Anwendung erforderlich. Kapseln unzerkaut und ungeöffnet schlucken**
- D.** 800 mg morgens u. abends (alle 12 Stunden) über 5 Tage
- H.** Für Pat., die nicht hospitalisiert sind, keinen zusätzlichen Sauerstoff benötigen u. ein erhöhtes Risiko haben, einen schweren Verlauf zu entwickeln. **Schwindel u. Kopfschmerzen könnten das Reaktionsvermögen beeinträchtigen.**  
Gebärfähige Frauen müssen vor d. Th. einen Schwangerschaftstest durchführen und Barrieremethoden (z. B. Kondom) sind als zusätzliche Verhütungsmaßnahme während u. bis 4 Tage nach der Th. anzuwenden (bzw. Abstinenz einzuhalten). Männer sollten während d. Th. und für 3 Mon. danach kein Kind zeugen.
- KI.** Kdr. u. Jgl. < 18 J. (keine Erfahr.), schwere Nierenfunktionsstör. (keine Erfahr.), Nierenfunktionsstör. jeglichen Grades (begrenzte Erfahr.). Bei Schwangerschaft nicht empfohlen. Bei gebärfähigen Frauen, die keine zuverlässige Verhütungsmethode anwenden, nicht empfohlen. Das Stillen während der Th. und 4d nach der letzten Dosis unterbrechen.
- NW.** **Schwindel u. Kopfschmerzen (h), Diarrhoe u. Übelkeit (h)**  
Bitte jede NW. melden!
- WW.** Keine klinischen Interaktionsstudien, keine klinisch wichtige WW. in vitro identifiziert
- MP.** unzerkaut und ungeöffnet

Fortsetzung s. nächste Seite