

**Nirmatrelvir + Ritonavir Paxlovid™**

- A.** Pinkfarbene ovale FTA (Nirmatrelvir) und weiße bis cremefarben kapselförmige FTA (Ritonavir) gleichzeitig einnehmen.
- D.** 300 mg Nirmatrelvir + 100 mg Ritonavir gleichzeitig alle 12 h über 5 d.  
Bei mäßiger Nierenfunktionsstör. (eGFR  $\geq 30$  bis  $< 60$ ) 150 mg Nirmatrelvir + 100 mg Ritonavir
- H.** Einnahme so schnell wie mgl. nach Diagnose von COVID-19 u. innerhalb von 5 d nach Symptombeginn. Es wird empfohlen, die 5-tägige Th. auch fortzusetzen, wenn d. Pat. hospitalisiert werden muss. Bei Einnahme kombinierter hormoneller Kontrazeptiva sollte eine andere wirksame Methode oder eine zusätzliche Barriere-Methode angewendet werden. Eine Schwangerschaft und das Stillen sollten während der Th. und bis 7 d danach vermieden werden.
- KI.** Keine Erfahr bei Pat.  $< 18$  J.; schwere L/N-Funktionsstör., Komb. mit AM, die eine stark CYP-3A-abhängige Clearance haben, Komb. mit starken CYP-3A-Induk., Anwendung unmittelbar nach Absetzen eines CYP-3A-Induk.
- NW.** Geschmacksstör. u. Diarrhoe u. Erbrechen (h), Kopfschmerzen (h)
- VWV.** Risiko schwerwiegender NW. aufgrund der Wechselwirkungen mit anderen AM, siehe KI. Ausführliche Darstellung in d. Fachinfo z.B. Johanniskraut, Lovastatin u. Simvastatin (Plasmakonz.↑, Myopathie-Risiko), Sildenafil u. Vardenafil (Dosisverringering), **estrogenhaltige Kontrazeptiva**↓, Levothyroxin (TSH-Überwachung), Antikoagulanzen wie Rivaroxaban (Blutungsrisiko) u. Warfarin↓