

## Pivmecillinam



### orales Penicillin

- A.** Einnahme mit der Mahlzeit, sitzend o. stehend mit mind. einem halben Glas Wasser. Regelmäßige Einnahme.
- D.** **Erw. u. Jgl.:** 3 x tgl. 200-400 mg über 3 Tage  
**Kdr. ab 6 J. mit KG < 40 kg:** 20-40mg/kg KG/Tag in 3-4 ED, TMD 1200 mg  
Berechnet als Pivmecillinam-HCl
- H.** Langzeit-Th. (über 3 Wo.) o. häufig wiederholte Anwendung sollten vermieden werden.
- KI.** Überempfindlichkeit gegen Penicilline o. Cefalosporine, Verengung d. Speiseröhre u.o. obstruktive Veränderungen im M/D-Trakt, Carnitin-Transporter-Defekte o. organische Azidurie, Porphyrrie. Vorsicht bei Carnitin-Mangel, instabilem Diabetes u. ungewöhnlich kleiner Muskelmasse. Komb. mit Valproat sollte vermieden werden.
- NW.** Vulvovaginale Pilzinfektion (h), Übelkeit u. Durchfall (h), pseudomembranöse Colitis/Durchfall durch Clostridium difficile verursacht mgl.
- WW.** Methotrexat<sup>↑</sup> - Ausscheidung<sup>↓</sup>), Probenecid (Pivmecillinam<sup>↑</sup> - Ausscheidung<sup>↓</sup>), Valproat (Carnitin-Mangel)
- MP.** Mit der Mahlzeit, sitzend oder stehend mit mind. einem halben Glas Wasser