
Ramipril/Amlodipin

**ACE-Hemmer und Calciumkanalblocker**

- A.** Regelmäßige Einnahme zur gleichen Tageszeit
- D.** 1 x tgl. zur gleichen Tageszeit - Dosierung sollte auf den Dosen der bisherigen Einzelkomponenten basieren
- H.** Nicht mit Grapefruitsaft einnehmen
- KI.** In Bezug auf Ramipril ► dort
In Bezug auf Amlodipin ► dort
Bei Kdr. u. Jgl. < 18 J. u. bei sehr alten u. gebrechlichen Pat. nicht empfohlen. Im I. Trimester d. Schwangerschaft u. in d. Stillzeit nicht empfohlen.
- NW.** Ödeme (Am.: sh), Kopfschmerzen/Schwindel (R.: h) u. Somnolenz (A.: h), Flush (A.: h), trockener Reizhusten u. Dyspnoe (R.: h), M/D-Beschw. (h), Muskelkrämpfe (h), Fatigue (h), Hautausschlag (R.: h), Palpitationen (Am.: h), Hypotonie u. Synkope (R.: h), Serumkaliumanstieg (R.: h)
- WW.** In Bezug auf Ramipril ► dort
In Bezug auf Amlodipin ► dort