

Rivaroxaban



Antithrombotikum, direkter Inhibitor von Faktor Xa

- A.** FTA zu 10 mg können unabhängig von d. Mahlzeiten eingenommen werden. **FTA zu 15 u. 20 mg müssen mit einer Mahlzeit eingenommen werden** (verminderte Resorption!), auch d. Anwendung distal des Magens sollte vermieden werden
- D. Prophylaxe von Schlaganfällen u. syst. Embolie:** 1 × tgl. 20 mg
Th. u. Prophylaxe von tiefen Venenthrombosen sowie Prophylaxe von Lungenembolien: initial 2 × tgl. 15 mg, nach 3 Wo. 1 × tgl. 20 mg
Nach größerer Hüft-Op: 1 × tgl. 10 mg über 5 Wo.
Nach größerer Knie-Op: 1 × tgl. 10 mg über 2 Wo.
- H.** Bei Blutungen ist der Arzt zu informieren. Absetzen von R. 24 h vor chirurg. Eingriffen. INR bei Th. mit Rivaroxaban nicht aussagekräftig FTA können unmittelbar vor d. Anwendung auch zerstoßen und mit Wasser o. Apfelsmus gemischt werden, die Nahrungsaufnahme sollte sich in diesem Fall unmittelbar anschließen
- KI.** Kdr. u. Jgl. < 18 J. (keine Erfahr.); klinisch relevante Blutungen, Läsionen o. signifikantes Blutungsrisiko, schwere Leberfunktionsstör., die mit einer Koagulopathie u. einem Blutungsrisiko einhergehen, Komb. mit anderen Antikoagulanzen. Komb. mit CYP-3A4-Inhib.¹. Vorsicht u. a. bei Komb. mit NSAR, ASS u. TAH (PPI in Erwägung ziehen) u. bei Pat. mit erhöhtem Blutungsrisiko, Nierenfunktionsstör., vasculärer Retinopathie u. Brochiektasien. Bei Pat. mit künstlichen Herzklappen nicht empfohlen
- NW.** (h): Blutungen (Epistaxis, gastrointestinale Blutungen), Anämie, Schwindel u. Kopfschmerzen u. Synkope, Tachykardie, Hypotonie, Hautreizungen, Fieber, periphere Ödeme, verminderte Leistungsfähigkeit. ▼ Dieses AM unterliegt einer bes. Überwachung – bitte jede NW. melden!

2 Rivaroxaban

WW. Azol-Antimykotika, HIV-Protease-Inhib. u.a. CYP-3A4-Inhib.¹ (Blutungsrisiko!); andere Antikoagulanzen u. NSAR u. TAH (Blutungsrisiko), starke CYP-3A4-Induk.² – auch Johanniskraut – (R.↓), Dronedaron (Komb. sollte vermieden werden)

¹ s.IH

² s.IK

Diese Angaben sind nicht vollständig – beachten Sie bitte die Erläuterungen und Hinweise ► Kap. 2