

---

## Semaglutid

---



### Antidiabetikum, Glukagon-like-Peptid-1-Rezeptoragonist

- A.** 1 x wöchentl. zu einer beliebigen Uhrzeit, sc. in den Abdomen, den Oberschenkel o. den Oberarm
- D.** Initial 1 x wöchentl. 0,25 mg, nach 4 Wo. sollte auf 0,5 mg erhöht werden. Nach mind. 4 Wo. kann auf 1 mg erhöht werden. Höhere Dosen nicht empfohlen. 0,25 mg ist keine Erhaltungsdosis. Der Tag d. Anwendung kann b. Bed. gewechselt werden, der Abstand zwischen 2 Dosen sollte aber mind. 72h betragen.
- H.** Bei Komb. mit einem Sulfonylharnstoff o. Insulin Beeinträchtigung d. Reaktionsvermögens mgl. (durch Hypoglykämie). S. mind. 2 Mon. vor einer geplanten Schwangerschaft absetzen.
- KI.** Begrenzte Erfahr. b. Pat. > 75 J., keine Erfahr. bei Kdr. u. Jgl. < 18 J.; S. sollte bei Diabetes Typ 1 o. bei Ketoazidose nicht angewendet werden. Bei Herzinsuffizienz NYHA IV nicht empfohlen (keine Erfahr.)
- NW.** Hypoglykämie (sh - bei Komb. mit einem Sulfonylharnstoff o. Insulin, h - bei Komb. mit einem anderen oralen Antidiabetikum), Übelkeit/Durchfall (sh - bes. in den ersten Mon.), weitere M/D-Beschw. (h), Schwindel (h), Cholelithiasis (h), Gewichtsreduktion (h), Komplikationen bei diabet. Retinopathie (h); bei Anzeichen einer akuten Pankreatitis wie heftigen Schmerzen im Oberbauch/Übelkeit u. Erbrechen (g) S. sofort absetzen.
- WW.** Antikoagulanzen vom Cumarin-Typ (häufige Überwachung des INR zu Th.-Beginn)