

Semaglutid



Antidiabetikum, Glukagon-like-Peptid-1-Rezeptoragonist

- A.** 1 x wöchentl. zu einer beliebigen Uhrzeit, sc. in den Abdomen, den Oberschenkel o. den Oberarm. Der Tag d. Anwendung kann b. Bed. gewechselt werden, der Abstand zwischen 2 Dosen sollte aber 72h betragen.
- D.** Initial 1 x wöchentl. 0,25 mg, nach 4 Wo. sollte auf 0,5 mg/Wo. erhöht werden. Nach mind. 4 Wo. kann auf 1 mg/Wo. erhöht werden, nach weiteren 4 Wo. auf 2 mg/Wo. Höhere Dosen nicht empfohlen. 0,25 mg ist keine Erhaltungsdosis.
Gewichtsreduktion Wegovy® (Erw. u. Jgl. ab 12 J. bei Adipositas u. KG > 60 kg): Initial 0,25 mg/Wo., Steigerung innerhalb 16 Wo. auf 2,4 mg/Woche. Weitere Steigerung nicht empfohlen.
- H.** Bei Komb. mit einem Sulfonylharnstoff o. Insulin Beeinträchtigung d. Reaktionsvermögens mgl. (durch Hypoglykämie). Frauen im gebärfähigen Alter sollten eine Verhütungsmethode anwenden. S. mind. 2 Mon. vor einer geplanten Schwangerschaft absetzen. Blutzucker kontrollieren. Erste Berichte über Steigerung d. Fertilität. Verzögerte Magenentleerung durch S. könnte bei Operationen (Narkose) ein Risiko sein.
- KI.** Diabetes Typ 1, Ketoazidose. Begrenzte Erfahr. b. Pat. > 75 J., keine Erfahr. bei Kdr. u. Jgl. < 18 J.; S. sollte bei Diabetes Typ 1 o. bei Ketoazidose nicht angewendet werden. Bei Herzinsuffizienz NYHA IV nicht empfohlen (keine Erfahr.)
Gewichtsreduktion Wegovy®: Keine Erfahr. bei Kdr. < 12 J., begrenzte Erfahr. bei Pat. > 75 J.
Kein Ersatz für Insulin bei Diabetes Typ 2. Nicht empfohlen bei Diabetes Typ 1, schweren L/N-Funktionsstör., Herzinsuff. NYHA IV, **Komb. mit anderen Produkten zum Gewichtsmanagement.** Vorsicht bei entzündl. Darmerkr., diabetischer Gastroparese

2 Semaglutid

NW. Hypoglykämie (sh - bei Komb. mit einem Sulfonylharnstoff o. Insulin, h - bei Komb. mit einem anderen oralen Antidiabetikum), Übelkeit/Durchfall (sh - bes. in den ersten Mon.), weitere M/D-Beschw. (h), Schwindel (h), Cholelithiasis (h), Gewichtsreduktion (h), Komplikationen bei diabet. Retinopathie (h); bei Anzeichen einer akuten Pankreatitis wie heftigen Schmerzen im Oberbauch/Übelkeit u. Erbrechen (g) S. sofort absetzen.

Gewichtsreduktion Wegovy®: M/D-Beschw. (sh), Kopfschmerzen (sh), Erschöpfung (sh), Hypglykämie u. diabet. Retinopathie bei Typ 2 Diabetes (h), Haarausfall (h), Cholelithiasis (h), akute Pankreatitis mgl. (Anzeichen ► oben)

▼ Dieses AM unterliegt einer zusätzlichen Überwachung. Bitte jede NW. melden.

WW. Antikoagulanzen vom Cumarin-Typ (häufige Überwachung des INR zu Th.-Beginn), Vorsicht bei AM, die eine rasche Resorpt. erfordern. Vorsicht bei Komb. mit Insulin, wenn eine diabet. Retinopathie vorliegt.