

## Tizanidin



### Muskelrelaxans, Antispastikum

- D.** Individuell, ein- u. ausschleichend. In 3-4 ED zu 2-6 mg; bei schmerzhaften Muskelverspannungen max. 16 mg/d, bei neurogenen spastischen Zuständen max. 32 mg/d
- H.** Bei Rauchern (> 10 Zigaretten/d) kann d. Wirkung vermindert sein
- KI.** Kdr. u. Jgl. < 18 J. (keine Erfahr.); schwere Leberfunktionsstör., Komb. mit Fluvoxamin u. Ciprofloxacin, Komb. mit  $\alpha_2$ -adrenergen Agonisten wie Clonidin sollte vermieden werden. Vorsicht u. a. bei Komb. mit AM, die d. QT-Intervall verlängern<sup>1</sup>, H/K-Erkr., Myasthenia gravis
- NW.** Müdigkeit u. Schwindel (sh), Schlafstör. (h), M/D-Beschw. (sh), Muskelschwäche (sh), Bradykardie (h), Hypotonie (h), Anstieg d. Transaminasen (h)
- WW.** Fluvoxamin u. Ciprofloxacin (T.↑ ► KI.), Amiodaron u. Mexiletin u. Propafenon u. Cimetidin u. Enoxacin u. Perfloxacilin u. Norfloxacin u. Rofecoxib u. orale Kontrazeptiva u. Ticlopidin (T.↑ - Komb. nicht empfohlen). Cytochrom P450 1A2 - Induk. (T.↓), Antihypertonika u. Diuretika (Blutdruckabfall), zentral wirksame AM u. Alkohol (sedierende W.↑), andere Muskelrelaxanzien (↑), Rifampicin (T.↓)

<sup>1</sup> s. QT

Fortsetzung s. nächste Seite