

Tolterodin



Urologisches Spasmolytikum, Muscarinrezeptor-Antagonist

- D.** 2 x tgl. 2 mg (FTA) o. 1 x tgl. 4 mg (REK)
Berechnet als Tolterodintartrat
- H.** Überprüfung d. Th. nach 2-3 Mon.
- KI.** Harnretention, unbehandeltes Engwinkelglaukom, Myasthenia gravis, schwere Colitis ulcerosa, tox. Megacolon; Vorsicht u. a. bei obstruktiven Stör. des M/D-Traktes o. des Harnabflusses, Neigung zu Darmträgheit, autonome Neuropathie, L/N-Funktionsstör., bei Pat. mit Risikofaktoren für QT-Verlängerung, Komb. mit starken CYP-3A4-Inhib.¹ sollte vermieden werden. Für Kdr. nicht empfohlen
- NW.** Mundtrockenheit (sh), Kopfschmerzen (sh-h), (h): Schwindel, Schläfrigkeit, trockene Augen u. Sehstör., M/D-Beschw., Dysurie, periphere Ödeme, Sinusitis
- WW.** Starke CYP-3A4-Inhib.²(T.↑), andere Parasympatholytika (T.↑), cholinerge AM/direkte Parasympathomimetika (T.↓), Metoclopramid u. Cisaprid (T.↓)

¹ s.IH

² s.IH

Fortsetzung s. nächste Seite