
Vericiguat



- A.** FTA können falls erforderlich unmittelbar vor d. Anwendung zerstoßen werden
- D.** In Komb. mit anderen Herzinsuffizienzmitteln initial 1 x tgl. 2,5 mg, Verdoppelung alle 2 Wo. bis zur Erhaltungsdosis von 1 x tgl. 10 mg
- H.** Vor Th.-Beginn Volumenstatus und Diuretikatherapie optimieren.
- KI.** Komb. mit anderen Stimulatoren der löslichen Guanylatzyklase z. B. Riciguat; keine Erfahr. bei Kdr. u. Jgl. < 18 J.
Bei Pat. mit schwerer Leberfunktionsstör. u. Nierenfunktionsstör. mit eGFR < 15 nicht empfohlen. Komb. mit PDE-5-Hemmern wie Sildenafil nicht empfohlen. Keine Erfahr. bei Pat. mit syst. Blutdruck < 100 mmHg
- NW.** Hypotonie (sh), Schwindel u. Kopfschmerzen (h), M/D-Beschw. (h), Anämie (h).
 Dieses AM unterliegt einer zusätzlichen Überwachung. Bitte jede NW. melden.
- WW.** PDE-5-Hemmer wie Sildenafil (Risiko Hypotonie), langwirksame Nitrate (keine Erfahr.)
- MP.** Mit der Mahlzeit